



**Intérêt :**

Ce test permet de mettre en évidence les œufs d'Oxyures (vers intestinaux), très fréquents chez les enfants et très contagieux, entraînant des démangeaisons et troubles du sommeil.

**Recommandations**

Effectuer le prélèvement au lever avant la toilette et les premières selles.

**Préconisations pour le prélèvement :**


- ⇒ Décoller le scotch transparent de son support.
- ⇒ Appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- ⇒ Retirer le scotch transparent et l'étaler sur la lame support.
- ⇒ Renouveler l'opération avec le second scotch.
- ⇒ Replacer les 2 lames dans l'étui.
- ⇒ Identifier l'étui avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
- ⇒ L'étui doit être acheminé au laboratoire dans les **plus brefs délais**.

**Résultats :** Le délai de rendu des résultats est de 3 jours

**Renseignements complémentaires (à renseigner par le patient)**

NOM – Prénom – Nom de Jeune Fille: .....

Date de naissance : .... / ..... / .....



**RENSEIGNEMENTS CLINIQUES : (à remplir par le préleveur)**

Symptômes  Démangeaisons  Reveils nocturnes  Douleurs abdominales  Perte de poids  
 Digestion difficile  Diarrhées  Pas de symptômes

Mêmes symptômes dans l'entourage?  Oui  Non

Délai de début des symptômes  1j  2j  3j  4j  5j  1sem  2sem  3sem  1mois  >1mois

Traitement antiparasitaire ?  Non  Oui  
**Si oui :**  Traitement en cours  Traitement terminé  Traitement pas commencé