



BIOLAB

Préconisation pour le patient
URINES 1ER JET
(en lieu et place du prélèvement urétral)

Réf : MU-C1-INS-009-V01
Version : 01
Applicable le : 30-04-2016

Effectuer impérativement le prélèvement au Laboratoire

Ce recueil permet la recherche d'infection causant une inflammation urétrale (urétrite).

Recommandations

- De préférence, recueillir les premières urines du matin ou s'abstenir d'uriner au moins pendant 3 heures.
- Recueillir les urines avant tout traitement antibiotique.
- Sinon attendre au moins 48h00 après l'arrêt du traitement Antibiotique, sauf en cas de signes cliniques aigus.

Préconisations pour le recueil

- 1. Se laver les mains avec de l'eau et du savon.
2. Faire une toilette locale du gland à l'eau.
3. Uriner ensuite dans le flacon stérile fourni par le laboratoire : 10 à 15 ml d'urines, soit entre 2 et 3 cm de hauteur
4. Eliminer la fin du jet dans les toilettes
5. Refermer soigneusement le flacon.
6. Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire et remplir la fiche de renseignements.

Résultats : La durée habituelle d'obtention de résultats est 4 jours

NOM – Prénom – NOM de jeune fille :

Date de naissance : ... / ... / ...

Date de prélèvement : ... / ... / ...

Heure de prélèvement : ...h...mn

Etiquette patient

COCHER AVEC UNE CROIX SVP [X]



RENSEIGNEMENTS CLINIQUES (à saisir par le préleveur)

[] NON SAISIS

Modalités de prélèvement [] prélèvement urétral [] premier jet urinaire

Symptômes locaux

[] Fièvre [] douleurs abdominales [] Ecoulement [] brûlure [] gêne [] démangeaison [] Ulcérations [] Pas de symptômes

Antécédents de symptômes semblables?

[] Non jamais [] Oui, rarement [] Oui, plusieurs fois par an

Délai de début des symptômes [] 1j [] 2j [] 3j [] 4j [] 5j [] 1sem [] 2sem [] 3sem [] 1mois [] >1mois

Prescription d'antibiotique

[] Oui [] Non [] Contrôle après traitement ==> si oui, déjà commencé ? [] Oui [] Non

Nom de l'antibiotique ?

- [] Amoxicilline-ac. clavulanique (AUGMENTIN) [] Amoxicilline (CLAMOXYL) [] Céfixime (OROKEN)
[] Ciprofloxacine (CIFLOX) [] Cotrimoxazole (BACTRIM) [] Ofloxacine (OFLOCET)
[] Azithromycine (ZITHROMAX) [] Metronidazole (FLAGYL) [] Amphoterecine B (FUNGIZONE)
[] Econazole (PEVARYL/GYNOPEVARYL) [] Miconazole (GYNODAKTARIN) [] Isoconazole (FAZOL)
[] Autre (préciser):

(1 seule réponse)